

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



09 juillet 1986

RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03  
N° de série continue 127

Bulletin n° 17

**LES IRRIGATIONS PAR DESSUS LESSIVENT LES PRODUITS DE CONTACT : PENSEZ-Y**

**AVANT TRAITEMENT** : Lisez les notices des produits. Attention aux mélanges.

- vérifiez les conditions de préparation de la bouillie, les incompatibilités et les risques de phytotoxicité.  
Cette vérification doit être systématique pour tout produit que vous utilisez pour la première fois, ou pour un nouvel usage d'un de vos produits habituels.
- mélanges : pas plus de 3 produits différents dans une même bouillie :  
Au delà, c'est augmenter les risques d'incompatibilité, de phytotoxicité... ou d'inefficacité du traitement.
- évitez de traiter pendant les fortes chaleurs.

**P1 : PECHER : Tordeuse Orientale** : début du 2ème vol  
**Maladies de conservation** : traitez en fonction des risques  
**PRUNIER : Carpocapse - rouille** : renouvelez vos traitements  
**P2 : POIRIER-POMMIER : Carpocapse** : des risques importants  
**POMMIER : Mineuse cerclée** : début de la protection larvicide  
**VIGNE : Mildiou** : des risques dans les parcelles atteintes  
**Oïdium** : pensez au traitement "baies comme un pois"  
**Tordeuses de la grappe** : 2ème vol amorcé  
**Acaris - cicadelles** : à surveiller  
**P3-4 : Tordeuses de la grappe** : tableau des produits utilisables

## ARBRES FRUITIERS

### PECHER

**TORDEUSE ORIENTALE** : Un regain d'activité

Protégez les fruits selon les préconisations de notre dernier bulletin.

N'oubliez pas vos jeunes vergers où les attaques sur pousses peuvent gêner la formation.

**MALADIES DE CONSERVATION** : Intervenez en fonction des risques  
Pluies, irrigation sur frondaison, inoculum dans le verger...

**OIDIUM** : Moins de risques pour les fruits, plus de risques pour les pousses

Dans les vergers où des taches sur fruits sont apparues, poursuivez encore la protection. Dans les autres vergers, surveillez l'apparition éventuelle d'oïdium sur pousses pour intervenir.

### PRUNIER

**CARPOCAPSE - ROUILLE** : Renouvelez la protection

Dès réception en région précoce et moyenne (ST JUST, AUBENAS)

En milieu de semaine prochaine en région tardive (MEYRAS).

**POIRIER - POMMIER**

**CARPOCAPSE : Maintenez la protection**

Les captures de ces derniers jours sont souvent importantes.

Lutte aménagée : si le seuil de 10 attaques (bulletin n° 15 du 26 juin) n'est pas atteint, la protection pourra être interrompue à partir du 10 - 15 juillet pour les régions précoces et moyennes, du 20 - 23 juillet pour les régions tardives.

**PUCERON VERT NON MIGRANT : Surveillez aussi les poiriers**

**POMMIER**

**BITTER PIT : 6 traitements de la mi-juin à la fin août (rappel)**

**OIDIUM : Protégez vos vergers jusqu'à l'arrêt de la pousse active**

Plus tard : traitements suivant les attaques.

**MINEUSE CERCLEE : Utilisateurs de larvicides, traitement dès réception**

Ne traitez que les vergers où la protection est nécessaire.

Produits utilisables : (nombre de jours : délais avant récolte)

Cyperméthrine à 3 g ma/hl (nb. spéc.) 7 jours, Fenprothrin à 10 g ma/hl (DANITOL également acaricide) 21 jours, Triflumuron à 10 g ma/hl (ALSYSTIN) 30 jours.

**VIGNE**

**MILDIOU : Poursuivez la protection dans les parcelles atteintes**

La maladie pourrait y redémarrer à l'occasion de pluies ou d'orages locaux.

Ailleurs, on pourra momentanément suspendre la protection.

Les rognages sensibilisent momentanément à la maladie par le développement de jeunes entre coeurs.

**OIDIUM : Intervenez au stade baie grosse comme un pois (rappel)**

Par la suite les grappes doivent être protégées jusqu'à la véraison.

**BLACK ROT : Toujours des risques en cas d'orage**

Dans les foyers habituels, utilisez un fongicide efficace.

**BOTRYTIS : Peu de risques actuellement**

Pour les parcelles arrivant, en ce moment, au stade fermeture de la grappe, les risques sont minimes. Pas d'imide cyclique.

Un point sera fait en cas d'augmentation sensible du risque.

**TORDEUSE DE LA GRAPPE : Des dates pour le traitement de la 2ème génération**

- Situation : Des pontes d'eudémis et les toutes lères éclosions viennent d'être observées à VALLON.

Pour la Cochylis, des pointes de vol ont été enregistrées en fin de semaine dernière (ORGNAC, ST MAURICE D'IBIE, AUBENAS...).

- Dates du traitement 2ème génération

. Dans les secteurs où Eudémis est importante :  
dès réception, en utilisant un produit à effet préventif et curatif.

. dans les autres secteurs :  
en milieu de semaine prochaine (16 - 17 juillet) en retardant de quelques jours pour les régions tardives (ST REMEZE).

- Produits : consultez le tableau ci-joint. Ajoutez au tableau :

. Produit pour traitement préventif : alphaméthrine (FASTAC) : 0,3 l/ha ; fenitrothion + trichlorfon (DICONTAL FORT) : 2 kg/ha.

. Produit pour traitement préventif ou curatif : méthomyl (METOVER) : 1,5 kg/ha ; méthomyl + parathion (VERFOR) : 2 l/ha.

- Une dizaine de jours après votre traitement, observez. Un 2ème traitement est nécessaire si plus de 10 % des grappes sont attaquées.

**ACARIENS - CICADELLES : Surveillez-les**

Pour intervenir le cas échéant avec un produit efficace.